vée, formant une sorte d'oreillette; les tubercules couverts des tries concentriques très accentuées et le reste du prothorax densément pubescent.

Écusson subcordiforme, avec une carène en forme d'accent circonflexe renversé, longé postérieurement par un sillon.

Élytres impressionnés fortement à la base et le long de la suture, couverts de fortes rides transversales à la base et d'une ponctuation écailleuse très accentuée et rapeuse sur le reste de la surface, ornés de taches pubescentes irrégulières et déchiquetées, situées contre la base, au tiers antérieur et au tiers postérieur, ainsi que d'une tache allongée antéapicale, placée le long de la suture. Le dernier segment abdominal sinué à l'extrémité, sillonné dans son pourtour et denticulé, l'épine du pygidium visible du dessous et également entre l'extrémité des élytres.

Patrie : Haut-Aouache (Éthiopie méridionale). Un exemplaire pris en avril 1905. Collections du Muséum de Paris.

JANTHE LAEVIS Kerr.

J'ai réuni, avec doute, à cette espèce l'unique exemplaire capturé. Ma collection ne renferme qu'un seul individu de l'espèce de Kerremans, déterminé par lui, et les deux sont un peu différents.

Coléoptères : Buprestides nouveaux de Madagascar des Collections du Muséum,

PAR ANDRÉ THÉRY.

Lampetis Vacheri nov. sp.

Long., 21 millimètres; larg., 7 millim. 75.

Ocelaire atténué en avant et fortement en arrière, peu convexe, d'un bronzé verdâtre avec des taches bleu d'acier sur les empâtements, les angles inférieurs du prothorax avec un tubercule aplati et arrondi, lisse, d'un bleu d'acier très brillant, les épaules teintées de pourpre; le dessous rugueux, rouge carminé sur le milieu du prosternum, du métasternum et la saillie intercoxale; le premier segment abdominal avec une petite tache lisse, bleu d'acier dans les angles postérieurs, le dernier segment abdominal avec un empâtement de forme ogivale, nettement limité sur les bords, lisse, très brillant, d'un bleu d'acier, à la base et n'atteignant pas le sommet du segment; tarses verts.

Tête couverte de reliefs vermiculés, avec un sillon pubescent le long des yeux, l'épistome excessivement réduit et largement échancré.

Prothorax en trapèze, peu bombé, grossièrement et irrégulièrement ponctué, sillonné au milieu avec la carène médiane réduite à un petit rudiment basal.

Élytres courts, les bords formant une courbe régulière de la base au sommet, couverts de stries ponctuées dont les intervalles portent des petites bandes longitudinales bleu d'acier, alternant avec des impressions finement ponctuées de même couleur que le restant de l'élytre.

Prosternum grossièrement ponctué sur les côtés avec la saillie lisse et très brillante, la partie lisse se continuant jusqu'à la marge antérieure et la touchant. Cette saillie bordée postérieurement d'une strie profonde interrompue en arrière; saillie intercoxale sillonnée profondément; dernier segment abdominal fortement impressionné dans tout son pourtour avec cette impression fortement pubescente; hanches postérieures avec une petite plaque lisse bleu d'acier; pattes grossièrement ponctuées; tarses assez courts.

Patrie : Imanombo Androy septentrional. Un exemplaire des Collections du Muséum (Capitaine Vacher).

Cette espèce est voisine de *L. curtula* Kerr.: elle en diffère par son prothorax sans carène et sans empâtements longitudinaux, son prosternum entièrement lisse au milieu, même en avant, le deuxième segment abdominal sans empâtement et le dernier avec une plaque lisse.

Polybothris Bouvieri nov. sp.

Longueur, 44 millimètres; largeur, 16 millim. 5.

Très robuste, subparallèle, très atténué en arrière. Dessus noir avec les impressions et la ponctuation bronzé-verdâtre; dessous teinté de verdâtre, sauf les plaques lisses de l'abdomen qui sont d'un bleu d'acier très foncé.

Tête rugueuse, à surface irrégulière, sillonnée sur le vertex et le long des yeux.

Prothorax dilaté antérieurement, entièrement rebordé sur les côtés, ayant exactement la forme de celui de *P. dilatata* Ol., mais à surface beaucoup plus rugueuse et avec les angles postérieurs un peu plus saillants et un peu plus aigus.

Élytres à peine plus larges que le prothorax à la base, très irrégulièrement couverts de larges impressions et excessivement rugueux, ayant, comme le *P. dilatata* Ol., un fort calus sur les bords à hauteur du tiers postérieur, mais ce calus n'est pas caréné; l'extrémité forme un angle très aigu à l'angle sutural, mais n'est pas prolongée en pointe.

Le dessous est très rugueux, la saillie prosternale est large, plane, très rugueuse et bordée d'une carène; l'extrémité de l'abdomen porte une grande plaque lisse très brillante occupant la moitié du troisième segment,

la totalité du quatrième et du cinquième, mais interrompue sur la moitié postérieure du cinquième par une tache transversale très finement ponctuée, verte dans le fond et couverte d'une très fine pubescence rousse manquant en grande partie sur l'insecte que j'ai en mains.

Patrie : Ambovombé Région de l'Androy. Collections du Muséum, un exemplaire provenant des chasses de Decorse.

Cette superbe espèce est intermédiaire entre *P. Lelieuri* Buq et *P. dilatata* Ol., mais elle se rapproche surtout de cette dernière. Je suis heureux de la dédier à M. le Professeur Bouvier, à qui j'en dois la communication.

Trachys Mathiauxi nov. sp.

Longueur, 3 millimètres.

Oblong, oralaire assez large, très brillant; tête et prothorax dorés; élytres bleus; dessous d'un noir verdâtre ; orné sur les élytres d'une fascie apicale droite, transversale, ne touchant ni la suture ni les bords latéraux.

Tête large, un peu excavée sur le front, avec le bord interne des yeux un peu saillant, le front plus large en haut qu'en bas, lisse.

Prothorax large et court, avec les côtés arrondis, les bords aplanis, les angles postérieurs presque droits, la base bisinuée avec le lobe médian tronqué, avec une profonde fossette arrondie dans les angles antérieurs, et les postérieurs impressionnés; lisse, bordé postérieurement de petits points et avec quelques gros points espacés sur le disque.

Écusson relativement grand, lisse.

Élytres un peu plus larges que le prothorax à la base, atténués en courbe régulière jusqu'à l'extrémité où ils sont conjointement arrondis; avec le calus huméral saillant et donnant naissance à une petite carène peu distincte et qui atteint à peine le milieu de l'élytre; ils sont assez fortement impressionnés au-dessus et au-dessous du calus huméral; le disque est orné de séries assez régulières de gros points superficiels, moins marqués sur les côtés et au sommet.

Dessous imponctué, au moins autant que j'ai pu m'en rendre compte sans décoller cet exemplaire unique.

Patrie : Andevorante (Madagascar).

Un exemplaire des Collections du Muséum d'histoire naturelle de Paris, par Mathiaux.

Cette espèce rentre dans le sous-genre *Habroloma*, bien que sa carène élytrale soit incomplète; elle est très voisine de *T. Hova* Théry; elle s'en distingue par sa taille plus grande, sa forme moins large, son écusson plus petit, ses élytres plus grossièrement ponctués, dépourvus de pubescence, et par sa carène latérale raccourcie.

Sicardia tristis nov. sp.

Longueur, 2 millim. 5.

Allongé, subparallèle, un peu rétréci au milieu, d'un bronzé obscur et très finement pubescent en dessus ; dessous obscur.

Tête bombée, fortement et régulièrement ponctuée, avec une impression sur le sommet du front; antennes plus longues que le prothorax, à articles allongés et longuement pubescents.

Prothorax régulièrement bombé, ayant sa plus grande largeur un peu après le milieu, rétréci en avant, avec la marge antérieure presque droite et sans stries distinctes, les angles antérieurs aigus, les côtés régulièrement arrondis et bordés de deux carènes réunies en avant et en arrière et assez distantes au milieu, l'inférieure cachée par-dessous, les angles postérieurs légèrement obtus, la base droite, la surface à ponctuation fine, serrée et très régulière.

Écusson subtriangulaire, allongé, lisse, brillant.

Élytres pas plus larges que le prothorax à la base, ayant leur plus grande largeur au quart postérieur, très peu atténués postérieurement, conjointement arrondis au sommet avec l'angle sutural droit bien marqué, finement rebordés latéralement, relevés en fin et étroit bourrelet à la base, impressionnés derrière l'épaule à surface un peu irrégulière et avec une forte impression triangulaire sur la suture à l'apex; ils ne portent aucune trace de stries, sont très finement ponctués et couverts d'une pubescence rousse très courte, dense et excessivement fine, visible surtout en regardant l'insecte de côté.

Patrie : Ambovombé (Madagascar). Un exemplaire des collections du Muséum d'histoire naturelle de Paris et un dans la mienne. (Decorse.)

Je n'ai pas décollé ces minuscules insectes et je n'en ai pas observé le dessous, me réservant de le faire plus tard en décrivant plus longuement le genre *Sicardia* qui est voisin des *Ankareus*, mais s'en distingue à première vue par ses antennes beaucoup plus longues que le prothorax, à articles allongés; sa forme parallèle et rappelant celle des *Attagenus*, enfin par l'aspect du corps vu de côté, celui-ci offrant une courbe des élytres à peine distincte de la courbe du prothorax, tandis que, chez les *Ankareus*, les élytres et le prothorax étant très bombés, les deux courbes sont nettement distinctes l'une de l'autre. La description complète de ce genre paraîtra dans un travail que j'ai actuellement en préparation.